

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.



Girheulit® HOM Tabletten

GLUTENFREI

1. Was sind Girheulit® HOM Tabletten und wofür werden sie angewendet?

Girheulit® HOM Tabletten sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Besserung rheumatischer Gelenksbeschwerden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Girheulit® HOM Tabletten beachten?

Wann dürfen Sie das Arzneimittel nicht anwenden?

Nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Was sollten Sie bei einer Selbstbehandlung beachten?

Bei akuten Zuständen, die mit Rötung, Schwellung, oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung des Arzneimittels?

Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Eine Beeinflussung der Wirkung des Arzneimittels durch andere Medikamente ist bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Girheulit® HOM Tabletten:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Girheulit® HOM Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie sind Girheulit® HOM Tabletten einzunehmen?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen das Arzneimittel nicht anders verordnet wurde:

Wieviel sollten Sie von dem Arzneimittel einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Sie sollten bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie das Arzneimittel einnehmen?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Eine Reizung der Mundschleimhaut ist möglich.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Girheulit® HOM Tabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach dem auf Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum.

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch 50 Tage.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

6. Weitere Informationen:

ZUSAMMENSETZUNG:

1 Tablette enthält: Wirkstoffe: Acidum benzoicum Trit. D 3 (HAB, V. 6) 50,0 mg, Acidum silicicum Trit. D 3 20,0 mg, Ammonium phosphoricum Trit. D 2 (HAB, V. 6) 40,0 mg, Colchicum autumnale Trit. D 4 60,0 mg, Kalium iodatum Trit. D 4 20,0 mg, Lithium carbonicum Trit. D 3 60,0 mg.

Bestandteile 1 – 6 über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile: Calciumbehenat, Kartoffelstärke.

INHALT: 100 / 200 Tabletten zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller ist das

Homöopathische Laboratorium, A. Pflüger GmbH & Co. KG, Röntgenstraße 4, D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Stand der Information: Februar 2015

Was versteht man unter Rheuma?

Wie äußern sich rheumatische Gelenkbeschwerden?

Der Begriff Rheuma umfasst eine Vielzahl von Erkrankungen der Gelenke und Weichteile.

Die Ursachen sind vielfältig, oft nicht exakt zu ermitteln und die Beschwerdebilder können sich sehr unterscheiden. Bei manchen Rheumaformen stehen die Gelenke, bei anderen die Knochen, Muskeln, Nerven oder Sehnen im Vordergrund.

Eine Gemeinsamkeit rheumatischer Erkrankungen ist der Rheumaschmerz, der die Beweglichkeit einschränkt. Oft finden sich Hinweise auf eine Entzündung des Gelenks.

Besonders die Morgensteifigkeit oder Unbeweglichkeit nach längerem Sitzen bzw.

Liegen fallen auf. Wetterwechsel verschlechtern häufig die Beschwerden.

Homöopathisch. Natürlich. Wirksam.

Homöopathisches Laboratorium A. Pflüger GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 4 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Tel. 05242.94720


PFLÜGER
HOMÖOPATHIE