

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  
bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf für den Fall, dass Sie später nochmals etwas nachlesen möchten. Ihr Therapeut, Arzt oder Apotheker hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.

## Rheucastin®

### 1. Was ist Rheucastin® und wofür wird es angewendet?

Rheucastin® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehört: Rheumatismus.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Rheucastin® beachten?

Rheucastin® darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen Salicylate, Colchicin oder Korbblütler,
  - bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
  - während der Schwangerschaft und in der Stillzeit.
- Während einer Therapie mit diesem Arzneimittel ist für sichere Empfängnisverhütung beider Geschlechter zu sorgen. Diese Empfängnisverhütung sollte von Männern noch 3 Monate nach Beendigung der Behandlung mit Rheucastin® betrieben werden. Frauen sollten bis zur folgenden Periode sicher verhüten.

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Anwendung von Rheucastin® zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Rheucastin® enthält Ethanol (Alkohol).

Dieses Arzneimittel enthält 19,8 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Tropfen entsprechend 52 Vol.-%. Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 3 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

### 3. Wie ist Rheucastin® einzunehmen?

Die folgenden Angaben gelten für Erwachsene, soweit das Arzneimittel nicht anders verordnet wurde:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie ist Rheucastin® aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach dem auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatum.

Nicht über 25 °C lagern.

## 6. Weitere Informationen:

### ZUSAMMENSETZUNG:

10 g (= 10,8 ml) enthalten:

Wirkstoffe:	
Berberis vulgaris Dil. D4	2,5 g
Colchicum autumnale Dil. D4	2,5 g
Gaultheria procumbens (HAB 34) Dil. D3	
[HAB, V. 4a, Urt. mit Ethanol 86 % (m/m)]	2,5 g
Pseudognaphalium obtusifolium Dil. D4	2,5 g

Bestandteile 1 – 4 über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.

1 g entspricht 22 Tropfen.

**INHALT:** 50 / 100 ml Mischung zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:  
Homöopathisches Laboratorium  
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG  
Röntgenstraße 4  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Stand der Information: Juli 2024

## Therapie bei Rheumatismus

*Beschwerden lindern, beweglich bleiben – das ist das Ziel der Therapie bei Rheumatismus. Gerade wenn unangenehmer Schmerz die Bewegungsfreiheit einschränkt, können Schonhaltungen weiterführende Probleme verursachen.*

*Neben der Einnahme von Rheucastin® können Sie weitere Maßnahmen ergreifen, um rheumatische Beschwerden zu lindern. Besonders im Fokus stehen neben ausgewogener Ernährung tägliche Bewegungsübungen, denn nur durch körperliche Betätigung können Gelenke langfristig geschmeidig gehalten werden. Hier sollten geeignete Sportarten bzw. Übungen ausgesucht werden, die die Gelenke schonen und gleichzeitig die Muskulatur kräftigen. Unterstützend kann die Verwendung von Bandagen dabei helfen, schmerzhafte Gelenke während der Übungen zu stabilisieren und die Beschwerden während der Durchführung zu reduzieren.*