**BIOCHEMIE PFLÜGER®**
**Nr. 17 Manganum sulfuricum D6**

Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:**
1 Tablette enthält: Wirkstoff:
Manganum sulfuricum Trit. D6 250,0 mg.

Sonstige Bestandteile: Calciumbehenat (DAB), Kartoffelstärke.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. 1 Tablette enthält 0,250 g Lactose (eine Quelle für 0,125 g Glucose und 0,125 g Galaktose). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

**17**

**Manganum sulfuricum D6**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauern der Krankheitssymptome während der Anwendung soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Nach Anbruch bitte kühl und trocken lagern.
Das Behältnis fest verschlossen halten.

Das Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden!

**Reg.-Nr. 57896.00.00**

**Inhalt: 400 Stück**
Tabletten zum Einnehmen.

08.25

PZN -06322377

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller:
**Homöopathisches Laboratorium**
**Alexander Pflüger GmbH & Co. KG**
**Röntgenstraße 4**
**33378 Rheda-Wiedenbrück**

PFLÜGER
SCHÜßLER-SALZE

Ch.-B.:
Verwendbar bis:

## GEBRAUCHSINFORMATION

**Gegenanzeigen:** keine bekannt.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt um Rat.

Bei Fragen zur Dosierung wenden Sie sich an Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten oder Apotheker.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden.

**Wechselwirkungen:** keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

**Art der Anwendung:**
Lassen Sie die Tablette nach der Einnahme langsam im Mund zergehen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** keine bekannt.
Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Stand der Information: Juli 2025

www.pflueger.de info@pflueger.de 0 52 42 / 94 72-0